

Musterfragen aus dem Fach Allgemein Chirurgie und Viszeral Chirurgie

Die Facharztprüfung findet in Form eines Multiple Choice (MC) statt. Hier finden Sie einige Musterfragen dazu, die vom Prüfungsausschuss zur Verfügung gestellt wurden. Anhand dieser Musterfragen (Stand 09/2018) können Sie sich mit der Prüfungsmethodik vertraut machen.

Bitte beachten Sie die Anmerkungen zu den Fragen 1-4.

Frage 1

Ein 72-jähriger fitter Patient kommt in die Ambulanz mit vor zwei Tagen begonnener Übelkeit, einmaligem Erbrechen und seit einigen Stunden Schmerzen im rechten Unterbauch. In der klinischen Untersuchung lässt sich ein deutlicher Druckschmerz im rechten Unterbauch mit Kopfschmerz und kontralateralem Loslassschmerz feststellen. Im Labor CPR um 4mg% mit Leukozyten um 10.000 U/l. Welche ist die wahrscheinlichste Diagnose?

- Appendizitis**
- Sigma-Divertikulitis
- Mesenterialinfarkt
- Myokardinfarkt
- Pneumonie

Anmerkung: Die richtige Antwort ist A. Alle anderen Erkrankungen kommen auch in Frage, nur die Appendizitis ist die wahrscheinlichste. In diesem Alter kann auch einmal eine Appendizitis klinisch untypisch (längere Anamnese, fehlendes oder marginales Entzündungslabor, etc.) verlaufen. Dies ist eine Erklärung zur „single-best answer“. Alle Fragen sind nach diesem Prinzip aufgebaut.

Frage 2



Um welche Lagerung handelt es sich?

- Rückenlage
- Steinschnittlage**
- Prone-Position
- Trendelenburg Lagerung

Anmerkung: Die richtige Antwort ist B. Es können statt regulär 5 möglichen Antworten, auch 4 vorkommen.

Frage 3

Die anteriore tiefe Sigmarektumresektion wird in welcher Lagerung durchgeführt?

- Steinschnittlage**
- Rückenlage
- Prone-Position
- Trendelenburg Lagerung
- Lloyd-Davis

Anmerkung: Die richtige Antwort ist A. Dies ist mit der vorherigen Frage ein Beispiel verknüpfter Fragestellungen, so wie die nächste.

Frage 4

Sie müssen bei einer tiefen anterioren Sigmarektumresektion assistieren, bei der nur eine maschinelle tiefe Anastomose mit dem kleinen Rektumstumpf in Frage kommt. Die Pflegekraft im OP fragt Sie, welche Klammergeräte sie herrichten soll. Was antworten Sie, welche Klammergeräte werden in der Regel verwendet?

- 1x linearer und 1x zirkulärer Stapler
- 2x linearer und 1x zirkulärer Stapler**
- 1x linearer und 2x zirkulärer Stapler
- 2x linearer und 2x zirkulärer Stapler

Anmerkung: Die richtige Antwort ist B. Es wird in der Fragestellung auf „in der Regel“ verwiesen, daher könnten auch zusätzliche Klammergeräte Verwendung finden, aber 2x linear (Durchtrennung Dickdarm und Rektum) sowie zur Anastomose ein zirkulärer Stapler sind das Minimum. Und der Einfachheit halber wird auch nicht zwischen schneidenden und nicht schneidenden linearen Stapeln unterschieden.

Frage 5

Dauerschäden nach iatrogenen Gefäßverletzungen durch invasive diagnostische oder therapeutische Interventionen sind abhängig von/vom

- der Lokalisation
- verwendeten Instrument
- verzögerten chirurgischem Eingreifen**
- der präexistenten Arteriosklerose
- Ausmaß des Wundhämatoms